



Erkinis encefalitas

Šylant orams ir praleidžiant daugiau laiko gamtoje atsiranda įvairių pavojų mūsų sveikatai. Vienas jų – erkinis encefalitas (EE). Remiantis Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, EE atvejai pradedami fiksuoti jau kovo-balandžio mėnesiais, tačiau didžiausias sergamumas būna birželio-spalio mėnesiais. Veiksmingiausia profilaktikos priemonė yra skiepai. Po 3 dozių maždaug 97,0 proc. paskiepytų asmenų susidaro apsauginis antikūnų titras. Rekomenduojama vakcinuotis ankstyvą pavasarį, kol erkės nėra labai aktyvios. Vakcinuoti galima vyresnius nei 1 metų vaikus. Rekomenduojame pasiskiepyti patiems ir paskiepyti savo vaikučius.

Sveiki vaikai = laimingi vaikai.

Pagrindinis skiepijimas	Dozė	Įprastinis planas	Greito skiepijimo planas
I dozė	0,5 ml	Pasirinkta data	Pasirinkta data
II dozė	0,5 ml	Nuo 1 iki 3 mėnesių po I vakcinacijos	7-14 dienų po I vakcinacijos*
III dozė	0,5 ml	Nuo 5 iki 12 mėnesių po II vakcinacijos	Nuo 5 iki 12 mėnesių po II vakcinacijos*
I revakcinacija	0,5 ml	3 m. po III vakcinacijos*	
Rev. (16–60 m.) arba (12–49 m.)*	0,5 ml	Kas 5 metus	
Rev. (>60 m.) arba (>49 m.)*	0,5 ml	Kas 3 metus	

*- gali skirtis priklausomai nuo vakcinos

Šiuo metu yra galimybė pasiskiepyti dviem vakcinomis nuo erkinio encefalito, todėl skiepavimo grafikas gali skirtis.

Šaltinis: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras



Parengė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Brigita Daunoraitė